



(19)

(11) Publication number:

51131875 A

Generated Document.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN(21) Application number: **50056475**(51) Intl. Cl.: **C07D403/04**(22) Application date: **12.05.75**

(30) Priority:

(43) Date of application
publication: **16.11.76**(84) Designated contracting
states:(71) Applicant: **YOSHITOMI PHARMACEUT IND
LTD**(72) Inventor: **KOTANI AKIJI
SHIRAKI MASAMI**

(74) Representative:

**(54) A PROCESS FOR
PREPARING NOVEL
PYRROLIDINE
DERIVATIVES**

(57) Abstract:

PURPOSE: Pyrrolidine derivatives shown by formula I (where R is H, a lower alkyl, aralkyl, aryl or group represented by formula -A- NR₁R₂; A is a lower alkylene; R₁ and R₂ are lower alkyls or may form a heterocyclic ring together with neighboring N atom).

COPYRIGHT: (C)1976,JPO&Japio



(2,000円)

特 許 願

昭和 50 年 5 月 12 日

特許庁長官 審 査 官 殿

1. 発明の名称

新規なピロリジン誘導体の製造法

2. 発 明 者

住所 福岡県東上郡吉富町大字広津 1326

氏 名 コ ケ ン ア ケ レ

(ほふ) 氏

3. 特許出願人

住所 大阪府東区平野町3丁目35番地
名 称 古 宮 製 薬 株 式 有 限 公 司
(872)
代表者 田 坂 元 祐

4. 代 理 人

住 所 大阪府東区平野町3丁目35番地
名 称 古 宮 製 薬 株 式 有 限 公 司
代表者 田 坂 元 祐

5. 添付書類の目録

- (1) 明 細 書 1 通
- (2) 要 約 書 1 通
- (3) 特許願副本 1 通


明 細 書

1. 発明の名称

新規なピロリジン誘導体の製造法

2. 特許請求の範囲

一般式



〔式中RはH、低級アルキル、アラルキル、アリ

ールまたは-A-N^{R1}R2で表わされる基を示す。

ここでAは低級アルキレンを、R¹、R²は同一


または異なる低級アルキルを示すか、あるいは

R¹、R²は隣接する窒素原子とともに複素環を

形成する基を示す。〕

で表わされる化合物を脱ベンジル反応に付すこと

を特徴とする、一般式




〔式中Rは前記と同義。〕

で表わされるピロリジン誘導体の製造法。

1. 発明の詳細な説明

本発明は、一般式



(1)

〔式中RはH、低級アルキル、アラルキル、アリ

ールまたは-A-N^{R1}R2で表わされる基を示す。

ここでAは低級アルキレンを、R¹、R²は同一

または異なる低級アルキルを示すか、あるいは

R¹、R²は隣接する窒素原子とともに複素環を

(4)

⑭ 日本国特許庁

公 開 特 許 公 報

⑪特開昭 51-131875

④公開日 昭51. (1976) 11. 16

②特願昭 50-56475

②出願日 昭50. (1975) 5. 12

審査請求 未請求 (全4頁)

庁内整理番号 5921 44

6855 44

7043 44

5921 44

⑤日本分類

16 E363

30 G133.21

30 H111.5

30 H111

⑤Int. Cl²

C07D403/04H

A61K 31/417

(C07D403/04

C07D203/14

C07D235/26)

形成する基を示す。]

で表わされる新規なピロリジン誘導体の製造法に
関する。

上記の定義において、より具体的には、低級アルキルとはメチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、第二ブチル、第三ブチルなどを、アラルキルとはベンジル、フェニル、エーノチルベンジルなどを、アリールとはフェニルなどを、低級アルキレンとはエチレン、プロピレン、トリメチレン、1-メチルトリメチレン、2-メチルトリメチレンなどを、複素環とはピロリジン、ピペリジン、4-メチルピペリジン、4-(2-ヒドロキシエチル)ピペリジン、モルホリンなどを示す。

一般式(I)の化合物は、本発明に従って、一般式

水素化カルシウム、亜鉛、カルマリンなど)による脱ベンジル反応。

たとえば、市販の5~20%パラジウム活性炭を用いる場合には、次の反応条件下に脱ベンジル反応は実施される。

反応圧力：常圧


水素源：水素

反応温度：室温ないし100℃の範囲

反応溶媒：水、アルコール(メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロパノールなど)、エーテル(ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサンなど)、酢酸などの単一あるいは混合溶媒

触媒使用量：原料の2%~10% (重量)

反応時間：数時間~数十時間



(I)

(式中Rは前記と同義。)


で表わされる化合物を脱ベンジル反応に付することにより製造される。

本発明でいう脱ベンジル反応とは、それ自体は常法である次の反応を包含する。

(i)金属触媒(ラネーニッケル、パラジウム触媒、白金触媒など)であり、これらは、活性炭、セライト、炭酸バリウム、絹などの担体に吸着させた形で用いてもよく、また酸化物、ハロゲン化合物などのような化合物として用いてもよい)を用いる。またまたは加圧下の水素化反応(水素源としては、気体水素、ヒドラジン、水素化カルシウムナトリウム、

(ii)ハロゲン化シアン(たとえばブロムシアン)による脱ベンジル反応。

ベンゼン、トルエンなどの溶媒中、一般式(I)の化合物は、アルコキシカルボニルクロリドあるいはベンジルオキシカルボニルクロリドを反応させて、一般式



(II)

(式中Rは前記と同義を、Rはアルキル(メチル、エチル、イソブチルなど)またはベンジルを示す。)]で表わされる化合物とし、ついで化合物(II)を酸またはアルカリにより加水分解するか、あるいはヒドラジンにより分解するか、あるいはRがベンジルの場合には、(i)で述べた水素化反応により、

またはハロゲン化水素酸(臭化水素酸、ヨウ化水素酸など)で処理することにより、目的化合物(I)に導く方法。

なお、(4)の場合には、一般式(I)の原料化合物は塩酸塩、硫酸塩、しゅう酸塩、マレイン酸塩、酢酸塩などの塩の形で用いてもよい。

反応終了後、目的物は遊離塩基として、塩酸、硫酸、リン酸などとの無機酸塩として、またはマレイン酸、コハク酸、しゅう酸、遊石酸、クメン酸、パラトルエンスルホン酸、ノランスルホン酸などとの有機酸塩として単離精製される。

かくして得られる一般式(I)の化合物およびその塩は、たとえば鎮痛作用、中枢神経作用などを有し、医薬として、また医薬品の中間体として有用である。

以下に実施例を示して、本発明を具体的に説明

ンズイミダゾリン-2-オン・塩酸塩1.0gが得られる。融点142~147℃。イソプロパノールから再結晶すると、融点145~147℃を示す。

実施例2

1-(1-ベンジル-3-ビロリジニル)ベンズイミダゾリン-2-オン7.3gを80%エタノール250mlに加え、濃塩酸を加えて塩酸塩としたのち、5%パラジウム炭素2.0gを加え、60~70℃で、常圧下、水素中で5時間かくはんした。反応液を濃縮した。残留物を水200mlに溶解し、重炭酸ナトリウムで中和した。水層をクロロホルム50mlで3回抽出したのち、水層を完全に減圧下濃縮する。残留物をイソプロパノール100mlで熱時3回抽出する。蒸留液一夜放置し、ろ過し、濃縮すると、淡黄色アノ状物4.0gを

するが、本発明の範囲はこれらに限定されるのではない。

実施例1

1-ベンジル-3-(1-ベンジル-3-ビロリジニル)ベンズイミダゾリン-2-オン1.60gを80%エタノール150mlに加え、濃塩酸を加えて塩酸塩としたのち、5%パラジウム炭素3.0gを加え、60~70℃で、常圧下、水素中で3時間かくはんした。反応液をろ過し、濃縮した。残留物を水200mlに溶解し、20%水酸化ナトリウム水溶液でアルカリ性とし、分層する油状物をベンゼン100mlで3回抽出する。有機層を合せて蒸留で脱水後減圧下で濃縮する。残留する淡黄色状物(1.2g)を酢酸エチル500mlに溶解し、計算量のエタノール塩酸を加えると、無色の1-ベンジル-3-(3-ビロリジニル)ベ

得る。本品に酢酸エチル少量を加えると結晶化する。イソプロピルエーテル100mlでよく洗い、ろ取すると、融点109-111℃の無色結晶状の1-(3-ビロリジニル)ベンズイミダゾリン-2-オン3.7gが得られる。本品を酢酸エチルにとかし、しゅう酸を溶解した酢酸エチルを加えると、しゅう酸塩が沈殿する。融点214-215℃(分解)の無色結晶。イソプロパノールから再結晶すると、融点222~223℃で(分解)を示した。

同様にして次の化合物が得られる。

- ① 1-メチル-2-(3-ビロリジニル)ベンズイミダゾリン-2-オン、塩酸塩の融点206~208℃
- ② 1-フェニル-3-(3-ビロリジニル)ベンズイミダゾリン-2-オン、塩酸塩の融点206

特開 昭51-131875 (4)

～200で

⑤ 1-(3-ビベリジノプロピル)-3-(3-

⑥ 1-フェニチル-3-(3-ビロリジニル)ベン
ズイミダゾリン-2-オン。

ビロリジニル)ベンズイミダゾリン-2-オン、

代理人 片岡 武 高宮 敏 勝

⑦ 1-(3-ジノチルアミノプロピル)-3-(
3-ビロリジニル)ベンズイミダゾリン-2-オ
ン、

⑧ 1-(2-ジメチルアミノエチル)-3-(2-
ビロリジニル)ベンズイミダゾリン-2-オン、

⑨ 1-(3-ホルマリノプロピル)-3-(3-
ビロリジニル)ベンズイミダゾリン-2-オン、

⑩ 1-(2-{4-(3-ヒドロキシエチル)-
1-ビベラジニル}エチル)-3-(3-ビロリ
ジニル)ベンズイミダゾリン-2-オン、

⑪ 1-(3-(4-メチル-1-ビベラジニル)
プロピル)-3-(3-ビロリジニル)ベンズイ
ミダゾリン-2-オン

6. 前記以外の発明者

カッセルアグニヤガ
住 所 大分県中津市大字上宮本 980 番地の 3
氏 名 白 木 敏 巳

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS

☒ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

☐ FADED TEXT OR DRAWING

☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

☒ SKEWED/SLANTED IMAGES

☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

☐ GRAY SCALE DOCUMENTS

☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

☒ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.